

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 20.05.2011 / 8361

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Ayçiçeği	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	100 ml/da
(IMI) Toleranslı Ayçiçeği Çesitleri		Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde; Ayçiçeği 4-10 yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Kırmızı köklü tilikkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Horozbitiği (<i>Amaranthus albus</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Sirkem (<i>Chenopodium album</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Seytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Zincir pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Çobandedneği (<i>Polygonum aviculare</i>)	120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde; Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Sirkem (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Canavar otu (Orabans) (<i>Orobancha cernua</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)	130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde; Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde iken uygulanır.
Bezelye	Kırmızı köklü tilikkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobancantası (<i>Caposella bursa-pastoris</i>) Sirkem (<i>Chenopodium album</i>) Seytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakkı şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Balılbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Çobandedneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kus otu (<i>Stellaria media</i>) İsrgan otu (<i>Urtica urens</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye	Kırmızı köklü tilikkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobandedneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Sirkem (<i>Chenopodium album</i>) Seytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakkı şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya	Kırmızı köklü tilikkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Südegen (<i>Euphorbia spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yerfıstığı	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakkı şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Çobandedneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Çukurova fener otu (<i>Physalis angulata</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Küsküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır. 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır. 125 ml/da
Yonca		Yonca 10-12 yapraklı dönemde iken uygulanır.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

KİRES ULTRA

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
		40 g/l İmazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanılmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Çilte hafif kaşıntı yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

- Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
- Göz ile teması halinde:** Yanma geçene kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
- Süre ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
- Soluması halinde:** Hastayı bitki koruma ürünü uygulanmış sahadan uzaklaştırmak ve suni teneffüs yaptırın.
- Yutulması halinde:** Hasta 2 bardak su içirilerek kusturulur. Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: İmazamox



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P273:** Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P391:** Döküntüleri toplayın.
- P501:** İçeriği/Kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanılmayınız.
- Bağlılara zehirlidir. Sulama buluşmalarını.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıratmayınız.
- IMI toleranslı olmayan ayçiçeği çeşitlerinde kesinlikle kullanılmayınız.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyüme koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem ve kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- İklim ve toprak koşullarının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sararma vb. görüntüler oluşturabilmektedir. Bu tür belirtiler normal olup, kısa sürede ortadan kalkar.
- Bosşalan ambalajları başka amaçlarla kullanılmayınız ve usulüne uygun imha ediniz.
- Doğrudan güneş ışığında ve sıcaktan korununuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANKARA

Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇ IR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tophane Sok. No:16 34100 Anadoluhisari Beşiktaş/İSTANBUL

A.Ö. Kimler V.D. 30200/88908 Merkez No: Sic. No: 69 Kağıthane

Merkez No: Sic. No: 0210-018-08000000

Ankara Şube No: Sic. No: 2-8274-06-8211356





DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRÂİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

KİRES ULTRA

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu B,2 Herbisit (Yabancı ot İlacı)

40 g/l Imazamox

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yeşil yapraza huzmelı meşe kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlandıktan sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

KİRES ULTRA yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.

İMİ Toleranslı Ayıççeği Çeşitleri: KİRES ULTRA İMİ toleranslı ayıççeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabans) ise ayıççeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

KİRES ULTRA uygulamasından sonra ekilecek bitkiler;

Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı

4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, dana, nohut, ayıççeği, tütün

9 ay sonra: Mısır, patates, çeltik, pamuk

12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

DİRENÇ YÖNETİMİ:

KİRES ULTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KİRES ULTRA**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda, bu otlara etkili bir herbisitle karıştırılarak uygulanabilir. Yaprak gübreleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRÂİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTACIYA
Merkez: Toplarıönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 **Fax:** (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRÂİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplarıönü Sk. No:16 / 4810. Anadoluhisarı/ Beykoz/ İSTANBUL

A. Kodu: 3020 / T. Sic. No: 6 / K. No: 42377 /

Merkez: Toplarıönü Sok. No:16 / Anadoluhisarı / İSTANBUL


Merkez: Toplarıönü Sok. No:16 / Anadoluhisarı / İSTANBUL

Antalya Şube: Toplarıönü Sok. No: 2 / 4817 / 4596-611596

ÜçüT TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

ÇİDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ÇADA VE KOTAYUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Aralık 2017



Genel Müdür Yardımcısı