

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 14.10.2011 / 8426

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Hiyar (Tarla-Sera)	(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	3 gün
Bağ *	Mildivö (<i>Plasmopara viticola</i>) Soğan mildivüsü (<i>Peronospora destructor</i>)	200 g/100 L su	28 gün
Soğan	Mildivö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/100 L su	7 gün
Patates	Mildivö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/da	7 gün
Domates	Mildivö (Mavi küf) (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/100 L su	7 gün
Tütün	Mildivö (Mavi küf) (<i>Peronospora tabacina</i>)	100 g/100 L su	28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayri bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilağı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana gelecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği:

Uygulamamın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaları yıkayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hiyardı kabakgillerde mildivö: Bitkiler kök atmaya başladığında veya ilk mildivö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanir ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Bağda mildivö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm boya ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün aralıklarla yapılır.

Soğanda mildivö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C'ye ulaşması ve orantılı nemin % 80'i bulması ile mücadelede başlanması gerektirir de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

Patatese mildivö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanir ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Domatese mildivö: İlağı mücadelede çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanir. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Tütünde mildivö (Mavi küf): Fidelekte tohumlar çimlenip fidelelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra ilaçlamalara başlanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CARMEN MZ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 - H5:40 olarak sınıflandırılmış bir fungistidir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CARMEN MZ**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamamın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 - H5:40 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Karışımın bekletmeden kullanılmasını tavsiye edilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

13 Haziran 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Mancozeb, Alkili Ester Sülfat



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye vermesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Uygulamadan İvi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolanmalıdır. 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarda satılmak kaydı firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 – 90 Fax: (0216) 308 65 84

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.



TEDAVİSİ:

Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

Özel bir antidotu yoktur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde: Yanma geçmeye kadar temiz su ile yıkayın, doktora gösterin.

Deri ile temas halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulgusuz elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Solunum yolu ile etkilenmelerde hasta temiz havaya çıkarılmalıdır.

Yutulması halinde: Ürün yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayın. Ağzını temiz su ile yıkayın ve bir miktar su içirin. Hemen tıbbi yardım çağırın.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur.

TEDAVİSİ:

Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde: Yanma geçmeye kadar temiz su ile yıkayın, doktora gösterin.

Deri ile temas halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulgusuz elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Solunum yolu ile etkilenmelerde hasta temiz havaya çıkarılmalıdır.

Yutulması halinde: Ürün yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayın. Ağzını temiz su ile yıkayın ve bir miktar su içirin. Hemen tıbbi yardım çağırın.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur.

TEDAVİSİ:

Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.