

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve No:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirine</i>)	30 g 100 L su	7 gün
Elma	Külleme (<i>Podospaera leucotricha</i>)	40 g 100 L su	14 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	30 g 100 L su	7 gün
Ayva	Ayva monilyası (<i>Sclerotinia liliarietiana</i>)	50 g 100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa-Sclerotinia laxa</i>)	40 g 100 L su	14 gün
Antepfıstığı	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	50 g 100 L su	-
Nar	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g 100 L su	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdaki hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karışımın işleme devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulama günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaları yıkayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİİ:

Elma karalekesi: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sırası bulunan yerlerde 3-5 gün önce). İkinci uygulama pembe rozet toruncu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde). Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma külemesi: Birinci uygulama pembe çiçek tomurucu döneminde. İkinci uygulama çiçek taç yapraklarının % 60-70'i döktüğü dönemde. Üçüncü ve diğer uygulamalar hastalık için uygun koşullar devam ettiği süreçte 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.


Armut karalekesi: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sırası bulunan yerlerde 3-5 gün önce). İkinci uygulama beyaz rozet döneminde. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 döktüğünde. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarına göre yapılmalıdır.

Ayva monilyası: Birinci uygulama çiçeklerin % 51 açılış döneminde. İkinci uygulama çiçeklerin % 50'si açıldığında. Üçüncü uygulama tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Kayısı çiçek monilyası: Birinci uygulama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte). İkinci uygulama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Narda kahverengi leke: Birinci uygulama çiçek tomurucuları belirginleşmeye başladığında yapılır. İkinci uygulama taç yaprakları döktüğünde yapılır. Üçüncü uygulama meyveler yarı büyüğe gelince yapılır.

Antepfıstığında karazenk: Birinci uygulama ilk enfeksiyonun başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek döktükünden sonra, dölenmeyi takiben meyvelerin buçday dânesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. İkinci ve diğer uygulamalar ise hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği süreçte 15 gün aralıklarla devam edilir.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

DORYAT WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)
Grubu C2 7 C3:11 Fungisit (Mantar İlacı)
% 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemle- inden uzak tutunuz.
- Bitki kruruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki kruruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen doza kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkama uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Dermal ilaçı yenden uzaklaşır ve temiz havaya geçmez. Doktora başvurunuz.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayan kesimlere ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmayın. Doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Eilirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Boscalid, Pyraclostrobin, Sodyum sülfat



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sıcıl ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verimlesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçerdiği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH403: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

• Balklara zehirlidir. yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

• Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında saklamak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Topraklı Sö. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84



Mehtmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
Ş. Geliştirme ve Teknik Tanıtımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DORYAT WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DORYAT WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaları tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 / C3:11 haricinde) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden önce kullanılması tavsiye edilir.



DOĞAL

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

DORYAT WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu C2:7 C3:11 Fungist (Yantar İlacı)

% 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
İstanbul Sk. No: 111 Kat: 111/111, Beşiktaş YB. 3005012000
Merkezi Tic. Sic. No: 27090018200000111
Mersis No: 0302001820000000115
Anadoluhisari Fabrika Tesisleri No: 2447
Antalya 2. Şube Tesisleri No: 100772
Antalya 3. Şube Tesisleri No: 100756
Cekirge Şubesi Tesisleri No: 20710
Mersis No: 0302001820000000114

Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**

25 Eylül 2019