

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.: 19.09.2011 / 8404



DOĞAL
KİMİYEVİ
MADDELER

Net Miktarı:
Azami Per. Satış Fiyatı:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizmaya Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasta Arasındaki Süre		
Buğday Arpa	Kandamasi İtalyan siğirdili Yatkı boyası kökü Taşkesen otu San ot Rum yelancı keten Yabani tere Boynuz otu Uzun süpürge otu Kiracı tırn Sarkık meyveli yavruağzı Yabani çivit otu Trakya hardalı Yabani hardal Süpürge otu Kaba fiğ Adi fiğ	(<i>Adonis aestivalis</i>) (<i>Anchusa azurea</i>) (<i>Asperugo procumbens</i>) (<i>Buglossoides arvensis</i>) (<i>Boreava orientalis</i>) (<i>Camellia draba</i>) (<i>Ceratium dichotomum</i>) (<i>Descurainia sophia</i>) (<i>Geranium stepporum</i>) (<i>Hypochaeris pendulum</i>) (<i>Isatis tinctoria</i>) (<i>Neslia apiculata</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Sisymbrium altissimum</i>) (<i>Vicia narbonensis</i>) (<i>Vicia sativa</i>)	50 ml/da 14 gün	50 ml/da	14 gün
Buğday Arpa	Tarla papatyası Saka dikenli Tarla hazeranı Boynuzlu yoğurt otu Çoban doğneği Tarla düzgün çiçeği Meryem dikenli Parmaklı yavşan otu	(<i>Anthemis fumariaefolia</i>) (<i>Carduus pycnocephalus</i>) (<i>Consolida regalis</i>) (<i>Gallium tricornutum</i>) (<i>Polygonum bellardii</i>) (<i>Ranunculus arvensis</i>) (<i>Silybum mariannum</i>) (<i>Veronica triphylla</i>)	60 ml/da	14 gün	14 gün
Buğday Arpa	Kekre Kokar ot Peygamber çiçeği Köy göğüren Doğu balılıbabası	(<i>Acropitilon repens</i>) (<i>Bifora radians</i>) (<i>Anthemis fumariaefolia</i>) (<i>Centaura depressa</i>) (<i>Cirsium arvense</i>) (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml/da	14 gün	14 gün
Misir *	İmamparmıdü Kırmızı kükütlü tilki kuyruğu Uzun lojusa otu Yatkı sırken Peygamber çiçeği Dil kantarı Gecelerisi Adı soda otu Köpek üzümü Domuz pitriği	(<i>Abutilon theophrasti</i>) (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Aristochloa mauretanum</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Chenopodium vulvaria</i>) (<i>Centaura depressa</i>) (<i>Gallium aparine</i>) (<i>Ipomoea stolonifera</i>) (<i>Salsola kali</i>) (<i>Solanum nigrum</i>) (<i>Xanthium strumarium</i>) (<i>Acropitilon repens</i>) (<i>Compositum arvensis</i>)	70 ml/da	14 gün	14 gün
Misir *	Kekre Tartı sarması	80 ml/da	-4 gün	-4 gün	

* Hibrit misir tohumu üretiminde ve şeker misri yetişirliğinde kullanılmış.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye doyu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama traçnesinin deposu yanyı kadar su ile doldurulur. Makinen karıştırıcı salış durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma - devam edilerek depo suyu tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılmalarına 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hizmeti memle kullanımındır. Hazırlanan karışım aynı gün içincé kullanılmalıdır. Uygulamalarının senin saatlerinde, rüzgarın veya az rüzgarlı havada koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesi ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekarla rüzgarın tespiti için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alınırlığı belirlenir ve dekara neda kullanıllacak su miktarı hesaplanır.

Dr. Yavuz BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

GIDA TARIM VE HAYVANÇILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞAL KİMİYEVİ MADDELER
ve ZİRAATLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toroslu Mah. No: 14/34-10 Anadoluhisarı Beşiktaş/İSTANBUL
A. K. Ümmüller V. D: 30/01/58/08 Nö: 1457 Tic. No: 63-1457 Antalya
Market Sat. No: 1457-4461-01
Antalya Jandarma: No: 2-6-2-0188-000-01
Antalya Jandarma: No: 2-6-2-0356-22-01

DOĞAL TAKIM
Ruhsat Mühendisi
Ruhsat Mühendislik

DOĞAL KİMİYEVİ MADDELER VE ZİRAATLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TAYRANG

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
	452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam		

DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ:
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H317: Alerjik tilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ:
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyiini solumaktan kaçının.
P264: Elde etmemeden sonra bol ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu ediven sonra bol ile iyice yıkayın.
koruyucu/yaz koruyucu kullanımını.
P330: Ağrıınızı çalkalayın.
P501: İğrenizi/kabı Uluslararası Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanımına tallimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDILECEK HUŞUSLAR:
Ariala zehirlidir, çırkekleme zamanı.
Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü sularda bulastırınmayınız.
Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
Uygulama sonrasında sıcak ve nemli şartlar içindeki etkinliği artırrıp hızlandırdıktan sonra yağın yığınlarının etkinliğini yeniden etkinleştirilebilir.
Kurak geçen yıllarda dağı iyi sonuç alır.
uygulamadan önce veya 2 saat sonra yağmurda sulama suyu almıştır.
Toprakta bakıme birkaçraz. Buğday, arpa ve misirdan sonra ekilecek mahsullere olsunsa bir etkisi yoktur.
Bogalan ambalajları başka maksatlar için kullanmayın.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanan ürünün bos ambalajının içine 1/4'ine kadar temiz su kojarak iyice çalkalayınız. Calkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltın. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi ve uyuşukluk görülebilir. Deri ve gözde tahrise sebebi olabilir.
İLK YARDIM ÖNLEMELERİ:
Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Hemen su ile 15 dakika süreyle yıkayın.
Deri ile teması halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayın. Kırılan gışsileriniçi çkarın ve tekrar giymeden önce yıkayın.
Solumması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.
Yutulması halinde: Kusturmayı, kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.
ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidioto yoktur. Doktor yargısına göre destekleyici tedavi/bakım uygulanır.

DİKKAT: Kullanımdan önce iyice çalkalayınız!

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

İÇİNDEKİLER: 2,4-D-2-ethylhexyl ester, Florasulam

Dekarla rüzgarın tespiti su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alınırlığı belirlenir ve dekara neda kullanıllacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Jugulamın tamamlandıktan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemiyi temizlik yapın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltın.

ÜSTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

TAYRANG uygulamalarında en iyi etki, yabanç otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyümeye içinde olduğu ve üstlerinin ububat tarafından kapاتılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

İububat (Buğday, arpa): Yabanç otların çıkışını tamamlayıcı devreden, hububatın kardeslenme çevresinin sınırlarına kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktıktı devreden sonra kullanılmıştır. Halinde istenen etki alınamaz ve tavyise edilmez. Dondan sonra veya gece don beklenenisi varsa uygulama yapmayın.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabanç otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulana sırasında ve sonrasında 7-10 gün, günlük ortalamaya sıcaklık 15 °C'in üzerinde olması gereklidir. Döleyışına bu dönemde sıcaklığına yükselen Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgebelerinde kullanılması tavyise edilmez.

DİRENC YÖNETİMİ:

TAYRANG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir hortumtur. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini tesvik etmektedir. Bu nedenle, direnç ekrarlanması gerektiliğinde TAYRANG'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını izmeyiniz. Uygulamanın uygulanmasına özen gösteriniz.

CARIŞABILİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı, herbisitlerden Fenoxaprop-p-ethyl terkili ürününe karşıtıdır. Diğer dar yapraklı herbisitler ile karıştırılması tavyise edilmez. EFOLAM 22 E ile karıştırılarak uygulayılabilir. Azot, fosfor ve potasyum terkili yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok mikarda karışım yapmadan önce on karışım denemeının yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kurut) şartlarda orijinal ambalajında açıldığında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fraksel, çayırlarının içindeki tozları ve bilyoları özelleşiklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satınalmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlere hatalı depolaması, hatalı kullanımması, hatalı karışımı veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA Merkez: Toplaronu Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR**TAYRANG****Suspo-Emülsiyon (SE)**

Grubu	O,4	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
	452,42 g/l	2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam	

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCET A.Ş.
Toplaronu Sk. No: 16 3610 Anadoluhisarı / Beşiktaş / İSTANBUL
A.Ş. Kullular V.O.: 30290138808 / Merkez Nk: 44644
Antalya Süleymanpaşa Ticaret Şube No: 177 - 188 / Antalya
Mekâş No: 0 242 188 08000
Ankara Satış Bürosu: 282 153 0000

ZİRAİ İLAÇLAR
Ziraat Mühendisliği
Üzgür TAŞKAN

06 Aralık 2017

GIDA TARIM VE HAVAYA VİZYON
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



N