

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarihi ve No.su: 31.12.2009 / 7490

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Ayçiçeği, Pamuk, Patates, Soğan	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Amaranthus albus</i>) (<i>Horozbiği</i>) (<i>Anagallis arvensis</i>) (<i>Apera spica-venti</i>) (<i>Atriplex patula</i>) (<i>Capella bursa-pastoris</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Chrozophora tinctoria</i>) (<i>Digitaria sanguinalis</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Euphorbia</i> spp.) (<i>Heliotropium europaeum</i>) (<i>Lamium amplexicaule</i>) (<i>Martiana</i> spp.) (<i>Papaver rhoeas</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Polygonum</i> spp.) (<i>Poa pratensis</i>) (<i>Setaria</i> spp.) (<i>Setaria verticillata</i>) (<i>Sisymbrium officinale</i>) (<i>Stellaria media</i>) (<i>Solanum nigrum</i>) (<i>Thlaspi arvense</i>) (<i>Urtica urens</i>)	Ekim öncesi 500 ml/da Çıks öncesi 500 ml/da
Mısır, Domates	(<i>Amaranthus albus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Chrozophora tinctoria</i>) (<i>Echinochloa colonum</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Snaps arvensis</i>) (<i>Solanum nigrum</i>) (<i>Köpek üzümü</i>) (<i>Tarla akça çiçeği</i>) (<i>Isrgan otu</i>)	Dikim öncesi 500 ml/da

Çok kumlu topraklarda yetişen bitkilerde kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yavaş yavaş kademeli olarak doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın istatistiksel olarak belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan tamamlandıktan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sisteminin çalışarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞ FİR

18 Ocak 2018

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H332:** Solunması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- H411:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P391:** Döküntüleri toplayın.
- P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EU4001:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ariklara zehirlidir, bitkilerin çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Uygulamadan iyi sonucu alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
- Bitki koruma ürünüden en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
- % 10'dan fazla organik madde içeren topraklarda yabancı ot kontrollünde azalma olabilir. Kurulu topraklarda kullanılmamalıdır.
- Su gölgenen yerlerde kullanılmamalıdır.
- RESORT 33 EC**'den en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır. Uygulama ve toprağa karıştırma düzgün yapılmamışsa, yabancı ot kontrolü azalır veya bitkiye zarar verir.
- Toprağa karıştırma işlemi, tavsiye edilenlerden daha derin yapılmışsa, yabancı ot kontrolü azalır.
- Ateşe yaklaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin, Xylol, Calcium dodecylbenzen sulphonate

