

ORGANOMİNİERAL GÜBRE

AZOTLU SIVI

ORGANOMİNİERAL GÜBRE

SUPEROZYME PLUS-N

ÜRÜNÜN GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ (w/w%)	
Organik Madde %	15
Toplam Azot %	8
Organik Azot %	0,3
pH (%10'luk)	8-10

Kullanılan Hammaddeler:
Deniz yosunu

**ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN
UZAK TUTUNUZ.**

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No :
Net Miktarı :
Bütü Ağırlığı :
: 1000 gr.
: 1050 gr.

Lisans Tarihi No.su : 31.07.2003 - 023
Tescil Tarihi No.su : 27.05.2004 - 0400

FİRMASI:



AZOTLU SIVI ORGANOMİNİERAL GÜBRE

- DAMLA SULAMA UYGULAMASI:** Tona 2 litre gelecek şekilde uygulama yapılır.
 - YAPRAKTAN UYGULAMA:** Sıvı seyreltilerek her türlü püskürtme aleti ve uçakla uygulanabilir.
- YAPRAKTAN UYGULAMA TAVSİYELERİ:**
MEYVE: Meyve ağaçları için 100 litre suya 100 ml doz önerilir.
Elma, Armut: Toplam 5-8 uygulama önerilir. 1. Uygulama Fare kulağı döneminde, 2. Uygulama Pembe tomurcuk döneminde, 3. Uygulama çiçekler %50 açığında, 4. Uygulama çiçeklerin 3/4'ü döktüğünde, 5. Uygulama meyveler çovuz büyüklüğünü aldığında, 6. Uygulama ise 5. Uygulamadan 14 gün sonra yapılır. Daha sonraki uygulamalara 12-14 gün aralıklarla bitkinin ihtiyacına göre önüne alınarak devam edilir.
- Narenliye:** Toplam 4-5 uygulama önerilir. 1. Uygulama çiçeklenme öncesi ya da çiçeklenme başlangıcında, 2. Uygulama tam çiçeklenme döneminde ya da taç yaprakların 2/3'sü döktüğüdür, 3. Uygulama yaz ilacları ile birlikte, 4. Uygulama hasat öncesi döküme karşı yapılır.
- Bağ:** Toplam 4-5 uygulama önerilir. 1. Uygulama ilkbaharda genç sürgün döneminde, 2. Uygulama çiçeklemenin %50 ye ulaştığı dönemde, 3. Uygulama dane bağlayınca, 4. Uygulama 3. Uygulamadan 2-3 hafta sonra yapılır.
- Şetal, Kayısı, Kiraz:** Toplam 2-3 uygulama önerilir. 1. Uygulama çiçeklenmenin erken devresinde, 2. Uygulama Taç yapraklar döktülünce, 3. Uygulama 2. Uygulamadan 3 hafta sonra yapılır.
- Etik:** Toplam 2-4 uygulama önerilir. 1. Uygulama beyaz tomurcuk çiçeklenmenin erken döneminde, 2. Uygulama Taç yapraklar döktülünce, 3. Uygulama meyve bağlamadan sonra, 4. Uygulama son uygulamadan 3 hafta sonra yapılır.
- Çiçek:** Toplam 3-4 uygulama önerilir. 1. Uygulama yeterli yaprak çiçeklenmesi için, 2. Uygulama ilk çiçeklenmede, sonraki uygulamalara 2-3 hafta aralıkla devam edilir.
- SEBZELER:** Bitkilerin gelişme dönemi ve gereksinimlerine göre değişmekte birlikte Dekara 120 ml **SUPEROZYME PLUS-N** uygun miktarda sıvı püskürtülür.
- Fasulye, Bezelye:** 1. Uygulama 4-6 yaprak döneminde, 2. Uygulama ilk çiçekler açınca, 3. Uygulama ilk baktıklar görüldüncce yapılır.
- Havuç, Soğan, Pırsaa, Şalgam:** 1. Uygulama yeterli yaprak yüzeyi oluncuına, 2. Uygulama yuvarlanma gelişmeye başladığı devrede yapılır.
- Brokoli, Lahana, Karnabahar:** 1. Uygulama 4-6 gerçek yaprak devresinde, 2. Uygulama baş oluşmaya başlayınca yapılır.
- Tatlı Merc:** 1. Uygulama bitkiler 10-20 cm boyda ulaştınca, 2. Uygulama bitkiler 40-50 cm boyda ulaştığında, 3. Uygulama ise püskül çikarımından hemen önce yapılır.
- Hıyar:** 1. Uygulama ilk gerçek dört yaprak oluşunca, 2. Uygulama ilk çiçek öncesi, 3. Uygulama ise 2. Uygulamadan 7-14 gün sonra yapılır.
- Kavun, Karpuz:** 1. Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında, 2. Uygulama çiçeklenme döneminde 3. Uygulama ise Meyve bağlayınca yapılır.
- YAPRAK SEBZELERİ:** Uygulama yapılabilirken yeterli yaprak düzeyi oluncu başlanır. 14 günlük aralıklarla uygulamaya devam edilir.
- Domates, Biber, Patlıcan:** 1. Uygulama bitkiler 15-20 cm boyda ulaşınca, 2. Uygulama çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde, 3. Uygulama ise meyve döneminde yapılır.
- TARLA BİTKİLERİ:** Ürün çeşit ve gereksinimlerine göre değişiklikler olmakla birlikte Dekara 120 ml doz tavsiye edilir.
- Daneli Bitkiler ve Yem Bitkileri:** (Hububat ve Kuyruk Daneli Bitkilerde)
Yazlaklarda: 1. Uygulama bitkiler 15-20 cm boyda ulaşınca, 2. Uygulama başaklar teşekkül etliğinde yapılır.
- Kışaklarda:** 1. Uygulama bitkiler durgun döneme girmeden önce, 2. Uygulama ilkbaharda gelişmeye başladığında, 3. Uygulama ise başaklar ortaya çıktığında yapılır.
- Mısır:** Gelişme döneminde 3 uygulama yapılır. 1. Uygulama bitkiler 15-20 cm boyda iken, 2. Uygulama bitkiler 25-40 cm iken, 3. Uygulama püskül çikarımından hemen önce yapılır.
- Ayrıceği ve Yağlı Tohumlarda:** 1. Uygulama bitkilerin erken gelişme döneminde, 2. Uygulama çiçeklenme döneminde yapılır.
- Soya Fasulyesi:** 1. Uygulama tomurcuklar görüldüğünde, 2. Uygulama tam çiçeklenme döneminde yapılır.
- Yonca ve Diğer Yem Bitkileri:** İlk uygulama erken ilkbaharda sonraki uygulamalar her biçimden veya otlamadan 8-10 gün sonra yapılır.
- Panırk:** 1. Uygulama iki gerçek yaprak oluştuğunda, 2. Uygulama Terek oluşumu başlayınca, 3. Uygulama Çiçeklenme başlayınca, 4. Uygulama Kozalar oluştuğunda yapılır.
- Şeker Pancarı:** 1. Uygulama 4-6 gerçek yaprak oluştuğunda, 2. Uygulama kök kalınlışmasını başladığında yapılır.
- Süts Bitkileri:** Püskürtülen sıvıya alınabilecek yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda başlanır, aykırı periyodlarla uygulamalara devam edilir.
- YAPRAKTAN UYGULAMA DIKKAT EDİLECEK NOKTALAR:**
- Uygulama rüzgârsız bir havada ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
 - Günün sıcak saatlerinde, yağmur öncesi ve hemen sonrasında uygulama yapılmamalıdır.
 - **SUPEROZYME PLUS-N**'in kallieli bir yayıcı yapıpıncı ile kullanılma dana iyi sonuç verir. (örneğin: **Supewet**)
 - Uygulama yapıpıklar ıslanmaya dek ino ve yazaş zararcekler halinde yapılır.
 - Kullanılan alete, bikini büyüklüğüne, ilacda kaplanacak alana bağlı olmakla birlikte deکارا 25-100 litre su karılınması önerilir.
- DEPOLANMASI:** Bu ürün koruyucu madde içermesine karşın doğrudan güneş ışığında ve aşırı sıcakta tutulmamalıdır.
- KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI:**
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA ESNASINDA HİÇBİR SEY YEMEYİNİZ VE SIGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE İYİ OKUYUNUZ.

İŞİN ADI: DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

İŞİN EBADİ: 27x15x3 MM

MALZEME: P.P. OPAK

GRAFİKLER: YASEMİN HİTAY

TARİH: 27.10.2011

RENKLER: 4 RENK TRİGROMİ + 1 RENK EKSTRA

■ PANTONE 2757 C

■ black

■ cyan

■ magenta

■ yellow

■ BİÇAK

BAHAR ETİKETİ™

Doğan Arasıllı Bulvarı İnönü Cad. No:101 34510 Esenyurt - İSTANBUL - TÜRKİYERel: +90 212 423 16 96 Fax: +90 212 423 54 50 www.baharetiket.com.tr