

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Sarı No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 20.08.2014 / 9771

APACHE 50 EC'nin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır. Sirt atomizörleri, sırt tutulmuşları, traktöre monte edilmiş polverizatörlere tabii edilir. Boş ambalajların dezenfeksiyonunda ambalajlar iyice süpürülüp, temizlendikten sonra tavan, taban dahil bütün sahnelere iyice uygulanmalıdır. Tarlada yapılacak olan uygulamalar zararlıların durumuna göre 7-14 günde bir tekrarlamalıdır.

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazıneği (<i>Bemisia tabaci</i>)	200 ml/da (larva, ergin)	4 gün
Lahana	Lahana güvesi (<i>Marstonia brassicae</i>)	150 ml/da (larva)	4 gün
Fasulye	Bakla yapraklıtı (<i>Aphis fabae</i>)	100 ml/100 l su (nimf, ergin)	4 gün
Domates	Yapraklıtı (<i>Aphis spp.</i>)	100 ml/100 l su (nimf, ergin)	4 gün
Hıyar	Pamuk yapraklıtı (<i>Aphis gossypii</i>)	100 ml/100 l su (nimf, ergin)	4 gün
Boş Ambar Uygulaması	Ambar böcekleri Patates güvesi (<i>Phthorinæa operculella</i>) Baklagil tohumböcekleri (<i>Bruchus spp.</i>) Buğday biti (<i>Sitophilus granarius</i>) Kırmızı biti (<i>Tribolium castaneum</i>) Pirinç biti (<i>Sitophilus oryzae</i>) Kuru meyve güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) Arpa güvesi (<i>Sitotroga cerealella</i>)	300 ml/100 m ²	4 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Taavşive dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinemi karıştırıcı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırıma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanacağı kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

15 Kasım 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAPUL ELMİŞİTİR



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

APACHE 50 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

1B İnsektisit (Böcek İlacı)

500 g/l Pirimiphos-methyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, taavşive edildiği şekilde ve taavşive edilen dozda kullanınız.
- **TAAVŞİVE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının için 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilağlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mide bulantısı, baş ağrısı, kas seğimmeleri gibi tipik kolihesteraz inhibitasyonu belirtileri görülebilir. Bitki koruma ürününün yutulması halinde nefes almada zorluk ve solunum durmasına neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile temas halinde: Yama geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.
Deri ile temas halinde: Uzun süreli temastarda, su ve sabun ile yıkama uzun süre durulamalıdır. Kimyasal buluşması elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verni. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şunu yerinde olmaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Tüm şüpheli durumlarda, Pam ve Toxogonin'dir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pirimiphos-methyl, Xyol



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H410: Sıcul ortamında uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273: Çevreye verilmemesinden kaçın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilif altında saklayın.
P501: İçeği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Eğer size doktor organik fosfor, karbamat veya thyokarbamat terkipli bitki koruma ürünleri ile çalışmanızı söylemiş ise bu bitki koruma ürünü ile çalışmayınız.
Anlara zehirlidir. Bitkiler üzerinde anlar varken uygulamaya yapmayınız.
Baiklara zehirlidir. Kalan mahsulü kuyu, havuz, çesme yatakları ve akarsulara dökmemeye. Sulara buluşmaktan kaçınınız.
Boşalan ambalajları herhangi bir çayeye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
Yeni bitki koruma ürünü uygulaması sahada hayvan otlatılmamalı ve excil hayvanlar burarlardan uzak tutulmalıdır.
Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ambar uygulaması yaparken ağız ve burnu için alan maske kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolanığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürününün kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Caddesi / ANTALYA
Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

Dr. Yunus Bayraktar Genel Müdür Yrd. Mühürü

UBUF TASKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ:

Pamukta titim beyazıneğine karşı beyazınek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Lahana güvesine karşı ergin çıkışları görüldükten sonra tarhada tesadüf olarak 50-100 bitki kontrol edilerek yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5 tanesi buluşık olursa kimyasal mücadele uygulanır.

Yapraklıtlarına karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüf olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprarda düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlanmalıdır. Bununla birlikte parazitot ve predatorler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalarının etkinliği gözlenmelidir.

Bos depolarda bitimin yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

DİRENC YÖNETİMİ:

APACHE 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup 1B) olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnc gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnc gelişimini geciktirmek için APACHE 50 EC'nin aynı üretim sezonunu içerisinde özenle toplan uygulama sayısını azaltın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU:

APACHE 50 EC'yi diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



Doğal

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

APACHE 50 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu

1B

Insektisit (Böcek İlacı)


500 g/l Pirimiphos-methyl

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toprak Sok. No:16 1810 Andoluş/İstanbul
A.Kimlikler YOL: 3021 18800 Merkez/İstanbul Şişli No: 68 Kadıköy
Ankara Şube T.C. Ticaret Sicil No: 27447 - Ankara
Madenler Mev. Sicil No: 201188-08000
Etiler Mev. Sicil No: 2827 - 53500
Ankara Şişli No: 2827 - 53500

Uğur TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

Dr. Yunus BAYRAKTAR
Genel Müd. Y. G. V. KAYMANLIK BAKANLIĞI



15 Kasım 2017
GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.