

BITKİ TAHAMMÜÜ:
Yüksek derecede ve spesifik etkili funguslere karşı direnç oluşturma ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenle dirençli ortaya çıkması ve gelişmesinin önlenmesi açısından ilaçlama programına **KORTIC 40 EC** veya diğer sterol inhibitörlerden farklı etki mekanizmasına sahip funguslerde dahil edilmesi tavsiye edilir. Aynı yerde bir sezonda bağda ve elmada 5'ten fazla, seker pancarında ise 2'den fazla **KORTIC 40 EC** uygulaması yapılmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

KORTIC 40 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORTIC 40 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekerlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞILILIK DURUMU:

KORTIC 40 EC bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında kalan pek çok bitki koruma ürünü ile karşılıdır. Uygulama için çok miktarda karşın yapılmadan önce ön karşın denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

KORTIC 40 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	G1,3	Fungisit (Mantar İlacı)
		400 g/l Flusilazole

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARİTİ A.Ş.
Toprakönü Sk. No:16 45110 Anadoluhisari / Koz/İSTANBUL
A.Kodunlar V.D: 3020/33808 Menzer Tic. Sic. No: 84 Kadıköy
Mevlana Sube Ticaret Sicil No: 2477 - 44644 /İstanbul
Menzer Ticaret Sicil No: 0370/01/08 08000
Antalya Sube Ticaret Sicil No: 24274/05/05 5211

UĞUR TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

Dr. Yunus BAYRAMI
Genel Yürütme Kurulu Başkanı

GIDA TİCARETİ VE ZİRAİ İLAÇLARI BAKANLIĞI
GIDA VE İLAÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞILILIK BELGESİ

06 Aralık 2017