



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 81466379-320.04.02-E.1237233  
Konu : TRIPP 900 EC

16.04.2019

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.NE  
Toplarönü Sokak No: 16 Anadoluhisarı Beykoz/İSTANBUL

Firmanız adına ruhsatlı bulunan TRIPP 900 EC (900 g/l Fosthiazate) isimli bitki koruma ürününe ait; patatete kök ur nematoduna (Meloidogyne spp.) karşı 250 ml/da dozunda tavsiye işlemi tamamlanmış olup 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de "Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre onaylanan etiket yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 e-imzalıdır

Ümit Uğur BAHÇE  
Bakan a.  
Daire Başkanı V.

Ek : Etiket (1 sayfa)

BELGENİN ASLI  
ELEKTRONİK İMZALIDIR  
  
Nezahat KARABULUT  
Büro Görevlisi

**Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Evrak Doğrulama Kodu : YNCQWNGSPWWCWAIOOHO Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>  
Eskisehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Cankaya/ Ankara

Bilgi için: Necdet Sırav KARAKOYUN

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 25.02.2015 / 10117

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kök-ür nematodları (Meloidogyne spp.)	500 ml/da (Toprak yüzey uygulaması) 170 ml/da (Damlama sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)	-
Patates	Kök-ür nematodu (Meloidogyne spp.)	250 ml/da	49 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

#### Kalibrasyon:

İlaçlama makinesinin kalibrasyonu; uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için;** baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü miktarı belirlenir.

#### Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### İlaçlama Makinesinin ve Ekipmanın Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmamızdır.

Damlama sulama sistemi ile yapılan uygulamalardan sonra ise, tank temiz su ile doldurulup, sistemi çalıştırılarak tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesini sağlayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa karıştırılmış olmalıdır.

**Toprak yüzey uygulaması:** TRIPP 900 EC sera toprağına pülverizatör ile uygulanır ve uygulamadan hemen sonra sulama yapılarak bitki koruma ürününün toprağına iyice nüfuz etmesini sağlanır. Daha sonra fidelerin tarlaya dikimine geçilir.

**Damlama sulama uygulaması:** Serada fide dikiminden 3-6 gün önce, damlama sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

#### Patatesteki Kök-ür nematodlarına karşı iki uygulama yapılması gerekmektedir.

1. Uygulama (250 ml/da dozda) ekim öncesi,
2. Uygulama (250 ml/da dozda) ise ilk uygulamadan 45 gün sonra yapılmalıdır.

#### DİRENÇ YÖNETİMİ:

TRIPP 900 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematostitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIPP 900 EC'ni aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

15 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

35



## DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

# TRIPP 900 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

Grubu	1B	Nematostit (Nematod İlacı)
-------	----	----------------------------

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Fosthiazate kolinerajik inhibe eder. Aşırı terleme, baş ağrısı, halsizlik, baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrısı, kusma, göz bebeklerinde küçülme ve kas seğirmesi gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

- Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
- **Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.
- **Deri ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulamalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
- **Soluması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
- **Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayan keskinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

2-4 miligram Atropin sülfat verilmelidir. Cyanosis varsa, Atropin'in bu dozda havalandırma önlemleri ile eş zamanlı olarak verilmelidir. Atropinizasyona en az 48 saat devam edilmelidir. Buna ilaveten 15-20 dakika sonra 1-2 gram 2-PAM (100 ml tuzlu suda) verilebilir. Morfin ve Epinephrin vermeyin.

#### ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fosthiazate, Xylol



#### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

- H301: Yutulması halinde toksiktir.
- H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H331: Soluması halinde toksiktir.
- H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

- P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyu/iyiz koruyucu kullanınız.
- P405: Kilit altında saklayınız.
- P501: İçeriği/Kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.
- EU401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çeçkenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü orijinal ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüt (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

#### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A.Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkeze: Toplularını Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

#### DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No: 27810 Mersis No: 030200180000011  
Mevki Sicil No: 030200180000015  
Antalya Sicil No: 030200180000017  
Antalya 3 Sicil No: 030200180000013  
Gıda İşletme No: 28710 Mersis No: 030200180000014

İçişleri Bakanlığı Tarafından  
Kırsal Gıda ve Tarım Bakanlığı  
Mevki Sicil No: 27810 Mersis No: 030200180000011